



**KEVZARA<sup>®</sup>**  
(sarilumab)



## PATSIENDI HOIATUSKAART

GZEE.SARI.17.09.00.50, sept 2017

▼ Selle ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta saate infot kodulehelt: [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee)

- See patsiendi hoiatuskaart sisaldab olulist ohutusteavet, mida peate teadma enne ravi alustamist KEVZARA<sup>®</sup>-ga, ravi ajal ja pärast ravi lõpetamist. Ravimit KEVZARA manustatakse süstina naha alla (subkutaanselt).
- Näidake seda kaarti kõigile teid ravivatele arstidele.
- Lugege KEVZARA pakendi infolehte, et saada lisateavet ja kasutamishiseid.

**Pöörduge viivitamatult arsti poole**, kui teil tekivad järgnevad sümptomid: palavik, higistamine, külmavärinad, püsiv kõha, kehakaalu langus, loidus või valu maapiirkonnas, mis ei möödu.

KEVZARA võib vähendada teie immuunsüsteemi vastupanuvõimet infektsioonidele, mis suurendab haigustesse nakatumise riski või raskendab olemasoleva nakkushaiguse kulgu.

- Rääkige oma arstile, kui teil on mis tahes nakkushaigus, te põete sageli erinevaid nakkushaigusi või nakkushaigused korduvad.
- Rääkige oma arstile, kui teid on hiljuti vaksineeritud või on kavas mis tahes vaksineerimine.
- Enne ravi alustamist KEVZARA-ga tuleb teil teha uuringuid, et välistada tuberkuloos.
- Enne ravi alustamist ja ravi ajal tehakse vereanalüüse, et jälgida vere valgeliiblede hulka.

## KEVZARA RAVIKUUPÄEVAD

**KEVZARA annus:**

**Alustamise kuupäev:**



**Patsiendi  
nimi:**



**Arsti  
nimi:**



**Arsti  
telefon:**

**Palun veenduge, et visiidil tervishoiutöötaja juurde oleks teil kaasas ka kõigi teiste teie ravimite nimekiri.**

**Hoidke seda kaarti alles 2 kuud pärast KEVZARA viimast annust**, sest kõrvaltoimed võivad ilmuda mõne aja jooksul pärast KEVZARA viimast annust.

**SANOFI GENZYME**



**REGENERON**